

Verbascum Königskerze	blattaria Schaben-	densiflorum Grossblütige	lychnites Mehlige	nigrum Schwarze	phlomoides Windblumen-	phoeniceum Violette	pulverulentum Flockige	thapsus Kleinblütige
Stängel	unverzweigt, im mittleren und oberen Teil schwach rippig, drüsenhaarig, Pfl. sonst kahl	wenig oder nicht verzweigt, geflügelt, wollig filzig	verzweigt (Seitenäste spitzwinklig abgehend), oben rippig kantig, fein angedrückt grauhaarig (mehlig-flockiger, kaum abwischbarer Filz), drüsenlos	rippig, flockig sternhaarig, meist braunviolett überlaufen, Pfl. vor allem im oberen Teil flockig behaart	wenig oder nicht verzweigt, rund, nicht (oder nur schwach) herablaufende Blattränder	dünn, oben rippig kantig, drüsenhaarig (Drüsenköpfchen fast schwarz), unten stielrund, fein flaumig	ausladend kandelaberartig verzweigt (fast rechtwinklig abgehende, bogig aufgerichtete Seitenäste), Pfl. noch während der Blütezeit mit abwischbarem flockigen Filz überzogen, Stg. stielrund	nicht oder nur wenig verzweigt, geflügelt, dicht wollig filzig
Blätter	Grundständige Bl gestielt, die oberen sitzend; randlich grob gekerbt, an der Basis oft fiederschnittig; nicht oder kaum am Stg. herablaufend	grundständige Bl undeutl. u. sehr kurz gestielt, stängelst. deutl. herablaufend, randlich grob gekerbt gezähnt bis gesägt, beiderseits dicht filzig	Grundst. Bl kurz gestielt, obere sitzend, nicht am Stg. herablaufend, randlich seicht gekerbt bis ganzrandig, unterseits graugrün behaart, mehlig flockig, kaum abwischbar	lang gestielt, nicht herablaufend, randlich grob gekerbt, dunkelgrün, zumindest oberseits kaum behaart, Blattstiele meist braunviolett überlaufen, Spreite der unteren Bl am Grund herzförmig	Grundständige Bl deutlich gestielt, stängelständige sitzend, nicht (oder nur wenig) herablaufend, am Rand grob gekerbt, beiderseits filzig,	Grundblattrosette dem Boden eng anliegend. Stängelblätter randlich grob gekerbt bis gebuchtet, oberseits spärlich, unterseits flaumig behaart, keine gegabelten Haare	Grundständige Bl kurz gestielt, mittlere und obere sitzend, nicht herablaufend	Grundständige Bl kurz gestielt, stängelständige sitzend, herablaufend, randlich flach gekerbt, beiderseits filzig
Blüten	Blütenstand sehr locker, traubig (einzeln, lang gestielt), Krone 25-30 mm Dm, hellgelb mit violetten Zotteln an der Basis der hinteren Kronzipfel. Aussenseite oft rostrot überlaufen	sehr kurz gestielt, Krone 35-50 mm Dm; Blütenstand dicht (doch etwas lockerer als bei V. thapsus)	kurz gestielt, etwas knäuelig angeordnet, Krone (10)12-18(-20) mm Dm, hellgelb (regional auch überwiegend weiss)	Blütenstand etwas aufgelockert, Krone 15-25 mm Dm, dunkelgelb, am Grund oft rot gefleckt	Blütenstand etwas aufgelockert (lockerer als bei V. densiflorum u. thapsus), Blüten kurzgestielt, Krone 35-55(60) mm Dm	locker in einfachen, langgestielten Trauben, Krone 25-30 mm Dm, violett (selten rot), am Grund gelblich	Blütenstand etwas aufgelockert, Krone 18-25 mm Dm, hellgelb mit braunen Streifen im Grund	Blütenstand dicht, Blüten sehr kurz gestielt, Krone 15-20(-30) mm Dm
Kelch			viel kürzer als die Frucht		so lang wie Frucht			
Staubblätter	Staubfäden unterschiedlich, zumindest an der Basis violett-wollig	3 Staubfäden weisswollig	Staubfäden weisswollig	Staubfäden violett-wollig	3 Staubfäden weisswollig	Staubfäden violett-wollig (bei den 3 hinteren Staubfäden gegen die Spitze weisslich wollig)	Staubfäden weisswollig	Längere Staubblätter mit 1-2 mm langen Staubbeutel
Narbe		keulenförmig-spateilig, am Griffel herablaufend			umgekehrt "u"-förmig			kopfig (nierenförmig-kugelig), am Griffel nicht herablaufend
Frucht	kugelig		kahl				behaart	